

THÔNG BÁO

Về việc chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại cây ăn quả có múi sau thu hoạch

Hiện nay, diện tích cây ăn quả trên địa bàn thị xã khoảng 323,85ha; trong đó cây ăn quả có múi 266,85 ha, hiện nay cây vừa thu hoạch xong. Bão Noru ngày 27, 28/9/2022 ảnh hưởng nhẹ và không có diện tích nào bị đổ ngã.

Qua điều tra theo dõi định kỳ, một số sâu bệnh gây hại như sâu đục thân, đục cành gây hại khoảng 60ha, sâu chủ yếu tuổi 5 và nhộng, tỷ lệ bệnh phổ biến 3-5%, nơi cao 5-10%; bệnh chảy gôm tiếp tục gây hại, tỷ lệ bệnh phổ biến 10- 15%, nơi cao 20- 40%, tập trung chủ yếu ở Hương Vân, Hương Bình. Sâu vẽ bùa gây hại cục bộ trên diện tích trồng 1-3 năm tuổi đang phát triển lộc mới. Ngoài ra có muội đen, rệp sáp, ... gây hại rải rác.

Thời gian tới thời tiết còn diễn biến rất phức tạp, các đối tượng sâu bệnh trên sẽ tiếp tục gây hại gia tăng, nhất là các vườn chăm sóc kém, bón phân không đúng quy trình. Để hạn chế thiệt hại do mưa bão và sự lây lan gây hại do các loài sâu bệnh trên gây ra, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp hướng dẫn biện pháp chăm sóc và phòng trừ một số sâu bệnh gây hại chính trong thời gian tới như sau:

1. Chăm sóc, bón phân

- Sau khi thu hoạch xong tiến hành vệ sinh cắt tỉa cành sâu bệnh, cành già, cành sát mặt đất, cành vượt nằm bên trong tán, bị che khuất, những cành vươn quá ra ngoài tán và đưa ra khỏi vườn để tiêu hủy tránh lây lan; làm sạch cỏ dại quanh gốc cây.

- Có biện pháp chống đỡ, cắt ngọn những cành cao, những cây có nguy cơ gãy đổ trước mùa mưa bão. Sau mưa bão khẩn trương khơi thông các mương thoát nước trong vườn, không được để đọng nước sau khi mưa; cắt, thu dọn những cành gãy đưa ra khỏi vườn và chống đỡ cây trở lại vị trí bình thường để sớm hồi phục.

- Bón phân: Tùy tuổi cây, năng suất thu hoạch vụ trước để bón phân đúng quy trình. Thường bón phân hóa học 4 đợt/năm: đợt 1 bón khi thu hoạch xong; đợt 2 bón khi cây bắt đầu ra hoa; đợt 3 bón khi cây có trái đường kính trái 1- 2cm; đợt 4 bón trước khi thu hoạch khoảng 1 tháng. Cách bón: đào rãnh quanh tán cây, rộng 20cm sâu 20cm, sau khi bón xong lấp đất lại. Lưu ý khi bón phân hóa học kết hợp với bón phân hữu cơ (phân chuồng có ủ chế phẩm Trichoderma).

- Tưới nước: Sau khi bón phân xong, tưới nước đủ ẩm cho cây, độ ẩm đạt 50- 60%; không nên tưới ướt đầm cho cây ngay sau bón phân đợt 1 gây thừa nước sẽ làm cho bộ rễ tơ mới của cây phát triển nhanh, hút dinh dưỡng lên cây và làm cho cây ra lộc đông ảnh hưởng đến việc xử lý ra hoa.

- Một số biện pháp tăng ra hoa, chống rụng trái: sau khi cắt tỉa cần vít các cành đang mọc thẳng đứng, vít cong xuống dưới cột vào thân cây (tạo một góc

khoảng 60⁰); khoan thân cây bằng dụng cụ chuyên dụng; Phun bổ sung Bo, Siêu lân... trước lúc ra hoa 1 tháng và khi quả có đường kính 2- 3cm,...

2. Biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại chính thời gian tới

- Bệnh cháy gom: Cây bị bệnh trên cành và thân có nhựa chảy ra, phần thân và rễ dưới mặt đất bị bệnh sẽ khô và thối, cây bị bệnh nhẹ sẽ giảm năng suất, nếu bệnh nặng cành khô và cây chết.

Thường xuyên kiểm tra vườn, khi phát hiện cây bị bệnh dùng dao cạo sạch vết bệnh đến phần gỗ, lau sạch rồi dùng một trong các thuốc như Aliette 80WP, Ridomil Gold 68WP, Vimonyl 72WP, Ridozeb 72WP... hòa nước để quét vào vết bệnh, quét 2- 3 lần, mỗi lần cách nhau 5- 7 ngày.

Hoặc dùng Agri-Fos 400 SL pha nồng độ: 1lít thuốc/1lít nước tiêm vào thân cây. Dùng khoan với mũi khoan có đường kính 6mm, khoan trên thân ở độ sâu 2- 3cm, độ cao cách mặt đất từ 40- 50cm (đường kính thân > 10cm). Liều lượng tiêm 30ml dung dịch thuốc đã pha/xi lanh tiêm, tiêm 2 lần cách nhau 30 ngày.

Trường hợp có mưa lũ lớn phải dọn sạch lớp phù sa quanh gốc. Định kỳ quét vôi vào phần thân và những cành gần mặt đất, nhất là trước mùa mưa.

- Sâu vẽ bùa: Sâu non đục vào ăn thịt lá dưới lớp biểu bì của mặt phiến lá, tạo thành các đường hầm ngoằn ngoèo, lá non bị hại kém phát triển, cong queo, giảm khả năng quang hợp, cây sinh trưởng chậm.

Cần theo dõi chặt chẽ các đợt lộc, chú ý đợt lộc sắp tới cây vừa thu hoạch xong; đợt lộc sau khi mưa, sau bón phân và tưới nước để phun phòng trừ kịp thời bằng các loại thuốc như Virtako 40WG, Trigard 100SL, Radiant 60SC, Mectinsuper 37EC, ... Lưu ý nên phun phòng trừ sớm khi lộc non dài 1- 2cm hoặc thấy triệu chứng gây hại đầu tiên của sâu.

- Sâu đục thân, đục cành: Sâu đục khoét tạo thành những đường hầm, để lại những mạt gỗ rơi xuống đất. Khi phát hiện cần cắt bỏ cành bị sâu đục, hoặc dùng dây thép nhỏ cho vào lỗ ngoáy và kéo sâu ra, hoặc dùng bông thấm thuốc Virtako 40WG, Ammate 150SC, Dylan 2EC,... nhét vào lỗ và bên ngoài trát đất để diệt sâu non. Kết hợp quét vôi vào thân, cành cây để hạn chế trứng thành ẻ trứng.

Ngoài ra, các đối tượng khác như rệp muội, châu chấu thường gây hại cục bộ trên lá non, đợt non nên thường xuyên kiểm tra để phòng trừ kịp thời trên diện hẹp.

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp đề nghị UBND các xã, phường có diện tích cây ăn quả có múi chỉ đạo và hướng dẫn bà con nông dân thực hiện các biện pháp chăm sóc và thường xuyên kiểm tra phát hiện, phòng trừ sâu bệnh kịp thời./.

Nơi nhận:

- Chi cục TT&BVTV;
 - UBND thị xã;
 - Ông Nguyễn Việt Hà-PCT thị xã;
 - Phòng Kinh tế thị xã;
 - UBND các xã, phường;
 - Lưu.
- (B/cáo)
- (P/hợp)

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH

Đoàn Phước Lễ